

Poulvac® Bursa, la solución de Pfizer contra las cepas hipervirulentas de Gumboro

- La cepa viral V877 pertenece al mismo grupo que las cepas hipervirulentas de campo aislada en España y Europa.
- Se trata de una cepa que requiere solo 8 pases en huevos embrionados para su atenuación para ser utilizada como vacuna, con gran capacidad para traspasar títulos elevados de anticuerpos maternos.

Pfizer Salud Avícola presenta **Poulvac® Bursa**, una vacuna del tipo "intermedia plus" o "caliente", destinada a la inmunización activa de pollos de más de 10 días, para reducir la mortalidad y las lesiones de la bolsa de Fabricio originadas por el virus de Gumboro.

Poulvac® Bursa, debe su alta eficacia en desafíos de campo causados por las cepas hipervirulentas a la cepa viral que contiene, V877, perteneciente al grupo molecular 6 (clasificación de D.J.Jackwood), el mismo grupo al que pertenecen la mayoría de las cepas hipervirulentas aisladas en campo en España y Europa.

Entre otras características la cepa V877 destaca por su gran capacidad para traspasar títulos elevados de anticuerpos maternos (≤ 500 unidades ELISA) y por el bajo número de pases –apenas ocho– en huevos embrionados que son necesarios para su atenuación.

Poulvac® Bursa se presenta, como liofilizado para suspensión en agua de bebida, en cajas de 10x5.000 y 10x2.000 dosis.

FICHA TECNICA POULVAC BURSA

Poulvac Bursa. Composición cualitativa y cuantitativa en principios

activos: Virus vivo de la enfermedad de Gumboro, cepa V877 10^{2,2} – 10^{3,4} D_{IE50}. **Forma Farmacéutica:** Liofilizado para suspensión en agua de bebida.

Indicaciones de uso y especies de destino: Para la inmunización activa de pollos con niveles de anticuerpos maternos ≤ 500 unidades ELISA, para reducir la mortalidad y las lesiones en la bolsa de Fabricio causadas por la enfermedad de Gumboro. **Contraindicaciones:**

No vacunar aves enfermas. No usar en bandadas infectadas que

muestren signos clínicos. **Posología y modo de administración:** Una dosis por pollo administrada en agua de bebida a partir de los 10 días de edad.

Tiempo de espera: Cero días. **Precacuciones específicas de seguridad que debe tomar la persona que administre el medicamento a**

los animales: Lavar y desinfectar las manos y el equipo tras la

vacunación. **Precacuciones especiales de conservación:** Conservar y transportar refrigerado (entre 2°C y 8°C). Proteger de la luz. No congelar.

Presentaciones comerciales: Envases de 10x5000 o 10x2000 dosis. N°

Reg. 2093 ESP. Prescripción veterinaria. TITULAR: Fort Dodge Veterinaria, S.A.